

Bénéfices du protocole FLUMEDICARE

Le protocole assure un parcours de sevrage rapide, d'une durée d'environ 10 jours. Les bénéfices de l'utilisation du flumazénil comprennent:

- Atténuation rapide des symptômes de sevrage
- Normalisation rapide des récepteurs aux benzodiazépines (BDZ)
- Absence de symptômes de sevrage désagréables
- Réduction du besoin irrépressible de médicaments psychoactifs
- Réduction du risque de rechute

À ce jour, tous les traitements ont été réalisés sans complications, avec une évolution positive et sans inconfort lié au sevrage.

Coût d'un sevrage aux benzodiazépines

Le coût du parcours FLUMEDICARE pour le traitement de la dépendance aux benzodiazépines est de 4 000 € pour 10 jours d'hospitalisation.

Il est néanmoins possible de contacter nos médecins spécialistes afin de connaître le contenu du programme de traitement FLUMEDICARE.

Le programme FLUMEDICARE pour la dépendance aux benzodiazépines est un parcours thérapeutique efficace, simple et sûr, conçu pour offrir des résultats concrets et durables.

Grâce à une approche innovante, le traitement intervient non seulement sur les aspects cliniques de la dépendance, mais également sur ses dimensions psychologiques et sociales, en accompagnant le patient à chaque étape de son rétablissement.

La réadaptation et la resocialisation constituent des étapes fondamentales du parcours, avec pour objectif de permettre à la personne de retrouver une vie pleine, autonome et épanouissante, libérée de la dépendance.

Pour toute information ou prise de rendez-vous:

✉ info@casadicurasangiorgio.it

☎ +39 0161987089

🌐 casadicurasangiorgio.it

> **Via Marchesi di Gattinara 16, Viverone (BI)**

Les consultations ambulatoires sont assurées à
Viverone, Turin, Milan et Castrocaro Terme.

Visitez notre site

— Scannez le QR code —



Consultez notre site Internet pour
toute information ou réservation



📷 @casadicurasangiorgio

📘 Casa di Cura San Giorgio

Directeur médical: Dr. Enrico Zanalda

Responsable scientifique: Dr. Augusto Consoli



Casa di Cura
SAN GIORGIO

PROTOCOLLE FLUMEDICARE de la Casa di Cura San Giorgio

*pour le sevrage des anxiolytiques et
hypnotiques (benzodiazépines)*



Grâce au parcours de formation théorique et pratique dispensé au sein de notre établissement par le Professeur Fabio Lugoboni, la Casa di Cura San Giorgio a mis en œuvre le protocole thérapeutique de perfusion continue de flumazénil, proposant un traitement spécialisé et de pointe pour la prise en charge de l'abus et de la dépendance aux anxiolytiques et aux hypnotiques.

Que sont les benzodiazépines?

Les benzodiazépines constituent une classe de médicaments psychotropes couramment prescrits pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Lorsqu'elles sont prises à la posologie correctement prescrite, pendant de courtes périodes ou de manière intermittente, elles sont très efficaces dans le traitement de l'anxiété, de l'insomnie, des crises de panique, de nombreux symptômes psychosomatiques et des convulsions.

Leur efficacité rapide en a fait les médicaments les plus utilisés dans le monde.

Exemples de molécules benzodiazépiniques couramment utilisées:

- Alprazolam
- Lorazépam
- Délorazépam
- Diazépam
- Lormétazépam
- Bromazépam
- Triazolam
- Flurazépam

La prise de ces médicaments à des doses inappropriées (doses élevées) et pendant des périodes prolongées (au-delà de 4 à 8 semaines) peut fréquemment conduire au développement d'une tolérance (nécessité d'augmenter progressivement la dose pour obtenir le même effet), d'une dépendance physique (nécessité de continuer à prendre le médicament sous peine de voir apparaître des symptômes de sevrage) et d'une dépendance psychologique (besoin de maintenir l'état de bien-être induit par le médicament).

Le parcours FLUMEDICARE pour le sevrage des anxiolytiques et hypnotiques

Le protocole FLUMEDICARE pour le sevrage des benzodiazépines est une méthode innovante utilisant le flumazénil. Ce protocole doit être réalisé sous étroite surveillance médicale, dans un environnement contrôlé.



Évaluation pré-thérapeutique

Avant le début du traitement, le patient fait l'objet d'une évaluation complète afin de déterminer son éligibilité au protocole. Une couverture antiépileptique est également mise en place (généralement par Depakin). Cette évaluation comprend l'étude des antécédents médicaux, de la dose et de la durée de l'utilisation des benzodiazépines, ainsi que de la présence éventuelle de comorbidités.



Stabilisation initiale

Dans certains cas, les benzodiazépines à courte durée d'action peuvent être remplacées par des benzodiazépines à longue durée d'action, telles que le diazépam, afin de stabiliser le patient avant de commencer le traitement par flumazénil.



Administration du flumazénil

Ce traitement, étudié et documenté dans différentes publications par le Professeur Fabio Lugoboni et son équipe de recherche, prévoit une perfusion sous-cutanée lente et continue d'une durée d'environ 7 jours. Le flumazénil agit sur les récepteurs cérébraux impliqués dans l'utilisation des benzodiazépines (BDZ) et peut contribuer à réduire les symptômes de sevrage. Au fil des années, le Professeur Lugoboni et son équipe ont traité avec succès plus de 1 000 patients. Ce traitement peut également être utile dans les cas d'utilisation concomitante de benzodiazépines et d'alcool.



Surveillance intensive

À l'issue de la perfusion, lorsque cela est possible, l'hospitalisation se poursuit pendant deux à trois semaines supplémentaires afin d'assurer le soutien nécessaire à la sécurité et à l'efficacité du traitement.



Soutien pharmacologique complémentaire

D'autres médicaments peuvent être utilisés afin de prendre en charge les symptômes de sevrage et de réduire le risque de complications. Ils peuvent notamment comprendre des anticonvulsivants, des bêtabloquants et d'autres traitements symptomatiques.



Soutien psychologique

Il est important d'assurer un soutien psychologique pendant toute la durée du processus de sevrage. Les thérapies cognitivo-comportementales et d'autres formes de counseling peuvent être utiles pour prendre en charge l'anxiété et les autres symptômes.



Suivi post-thérapeutique

Après la phase de sevrage par flumazénil, le patient bénéficie d'un accompagnement continu afin de prévenir les rechutes. Celui-ci peut comprendre des thérapies psychologiques, des programmes de réadaptation et un soutien pharmacologique continu.



Surveillance à long terme

Un suivi régulier est essentiel afin de surveiller l'évolution du patient et d'apporter, si nécessaire, les ajustements appropriés au plan thérapeutique.

