

Benefici del protocollo FLUMEDICARE

Assicura un rapido percorso di disintossicazione, della durata di circa 10 giorni. I benefici dell'uso del flumazenil sono:

- Rapida attenuazione dei sintomi d'astinenza
- Rapida normalizzazione dei recettori delle BDZ
- Assenza di spiacevoli sintomi di astinenza
- Riduzione del desiderio insaziabile di farmaci psicoattivi
- Riduzione del rischio di ricaduta

Sin qui tutti i trattamenti si sono svolti senza problemi con esito positivo e senza disagio astinenziale.

Costo di una disintossicazione da benzodiazepine

Il costo del percorso FLUMEDICARE per la cura della dipendenza da BDZ è di € 4.000 per 10 giorni di ricovero.

È comunque possibile contattare i nostri medici esperti per scoprire cosa comprende il programma di trattamento FLUMEDICARE.

Il programma FLUMEDICARE per la dipendenza da benzodiazepine è un percorso efficace, semplice e sicuro, progettato per offrire risultati concreti e duraturi.

Grazie a un approccio innovativo, il trattamento interviene non solo sugli aspetti clinici, ma anche su quelli psicologici e sociali della dipendenza, accompagnando il paziente in ogni fase del recupero.

La riabilitazione e la risocializzazione rappresentano passaggi fondamentali del percorso, con l'obiettivo di restituire alla persona una vita piena, autonoma e gratificante, libera dalla dipendenza.

Per informazioni o prenotazioni

✉ info@casadicurasangiorgio.it

☎ +39 0161987089

🌐 casadicurasangiorgio.it

> **Via Marchesi di Gattinara 16, Viverone (BI)**
Gli ambulatori hanno sede a **Viverone, Torino, Milano e Castrocaro Terme.**

Visita il nostro sito

— Scansiona il QR code —



Accedi al nostro sito web per informazioni o prenotazioni



📷 @casadicurasangiorgio

📘 Casa di Cura San Giorgio

Direttore Sanitario: Dott. Enrico Zanalda
Responsabile scientifico: Dott. Augusto Consoli



Casa di Cura
SAN GIORGIO

PROTOCOLLO FLUMEDICARE della Casa di Cura San Giorgio

*per la disintossicazione da ansiolitici e
sonniferi (benzodiazepine)*



Grazie al percorso di formazione teorica e pratica svolto presso la nostra struttura dal Prof. Fabio Lugoboni, la Casa di Cura San Giorgio ha implementato il protocollo terapeutico di infusione continua di flumazenil, offrendo un trattamento specialistico e all'avanguardia per la gestione dell'abuso e della dipendenza da ansiolitici e ipnotici.

Cosa sono le benzodiazepine?

Le benzodiazepine sono una classe di psicofarmaci comunemente prescritti per trattare l'ansia e l'insonnia, se assunti in dosaggio correttamente prescritto, per periodi brevi o in modo intermittente, risultano molto efficaci nel curare l'ansia, l'insonnia, gli attacchi di panico, molti dei sintomi psicosomatici e le convulsioni.

La loro rapida efficacia li ha resi i farmaci più utilizzati a livello mondiale.

Esempi di molecole benzodiazepiniche di uso più frequente:

- Alprazolam
- Lorazepam
- Delorazepam
- Diazepam
- Lormetazepam
- Bromazepam
- Triazolam
- Flurazepam

L'assunzione di questi farmaci in dosi non corrette (dosaggi elevati) e per periodi prolungati (oltre le 4-8 settimane) può frequentemente portare il soggetto a sviluppare tolleranza (necessità di aumentare progressivamente la dose per ottenere lo stesso effetto), dipendenza fisica (necessità di continuare ad assumere il farmaco pena la comparsa di sintomi di astinenza) e psicologica (bisogno di perpetuare lo stato di benessere che il farmaco induce).

Il percorso con FLUMEDICARE per la disintossicazione da ansiolitici e sonniferi

Il protocollo FLUMEDICARE per la disintossicazione da benzodiazepine è un metodo innovativo che utilizza il flumazenil. Questo protocollo deve essere eseguito sotto stretta supervisione medica in un ambiente controllato. Vediamo insieme i punti principali:



Valutazione pre-trattamento

Prima di iniziare il trattamento, il paziente viene sottoposto a una valutazione completa per determinare la sua idoneità al protocollo e si avvia la copertura antiepilettica (di norma Depakin). Questo include una valutazione della storia medica, della dose e della durata dell'uso di benzodiazepine e della presenza di eventuali comorbidità.



Stabilizzazione iniziale

In alcuni casi, le benzodiazepine a breve durata d'azione possono essere sostituite con benzodiazepine a lunga durata d'azione, come il diazepam, per stabilizzare il paziente prima di iniziare il trattamento con flumazenil.



Somministrazione di flumazenil

Questo trattamento, studiato e dimostrato attraverso varie pubblicazioni dal Prof. Fabio Lugoboni e dal suo gruppo di ricerca, prevede un'infusione sottocutanea lenta e continua della durata di circa 7 giorni. Il flumazenil agisce sui recettori cerebrali coinvolti nell'uso delle benzodiazepine (BDZ) e può aiutare a ridurre i sintomi di astinenza. Il prof. Lugoboni e la sua equipe hanno trattato, negli anni, oltre 1.000 soggetti con successo. Può essere utile anche nei casi di uso combinato di benzodiazepine e alcol.



Monitoraggio intensivo

Conclusa l'infusione, ove possibile, la degenza prosegue per altre due o tre settimane per sostegno e monitoraggio per garantire la sicurezza e l'efficacia del trattamento.



Supporto farmacologico aggiuntivo

Possono essere utilizzati altri farmaci per gestire i sintomi di astinenza e ridurre il rischio di complicazioni. Questi possono includere anticonvulsivanti, beta-bloccanti e altri farmaci sintomatici.



Supporto psicologico

È importante fornire supporto psicologico durante tutto il processo di disintossicazione. Terapie cognitive-comportamentali e altre forme di counseling possono essere utili per affrontare l'ansia e altri sintomi.



Follow-up post-trattamento

Dopo la fase di disintossicazione con flumazenil, il paziente riceve supporto continuo per prevenire le ricadute. Questo può includere terapie psicologiche, programmi di riabilitazione e supporto farmacologico continuativo.



Monitoraggio a lungo termine

È essenziale un follow-up regolare per monitorare i progressi del paziente e apportare eventuali aggiustamenti al piano di trattamento.

